

II. Untersuchungsstatistik über in Federspulen lebenden Federmilben

Untersuchungszeitraum 15.12.1999 bis 31.12.2009

Wirt		Häufigkeit des Nachweises
1	Blaunacken-Mausvogel (<i>Urocolius macrourus</i>)	1
2	Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	1
3	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	1
4	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	7
5	Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)	1
6	Grünfink (<i>Carduelis chloris</i>)	1
7	Haarschopfturako (<i>Tauraco persa</i>)	1
8	Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)	1
9	Maskengimpel (<i>Pyrrhula erythaca</i>)	2
10	Pfuhschnepfe (<i>Limosa lapponica</i>)	2
11	Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	1
12	Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	1
13	Rotschwanzhäherling (<i>Trochalopteron milnei</i>)	1
14	Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i>)	2
15	Veilchenastrild (<i>Granatina ianthinogaster</i>)	2
16	Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	1
17	Weißbauchlärmvogel (<i>Criniferoides leucocaster</i>)	1
Gesamt:		
	17 Vogelarten	27 Nachweise